



VII.

# Türkiye Acil Tıp Kongresi

13-16 Ekim 2011

KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi, Trabzon

## TATKON 2011



BİLDİRİ VE KONUŞMA ÖZETLERİ

## P-48 ACİL SERVİSTEN İNTİHAR GİRİŞİMİ NEDENİYLE PSİKOSOSYAL DESTEK BİRİMİNE YÖNLENDİRİLEN 15 YAŞ ÜSTÜ OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

ATAMAN KOSE <sup>1</sup>, SUNA ERAYBAR <sup>1</sup>, BERİL KÖSE <sup>2</sup>, ÖZLEM KÖKSAL <sup>1</sup>, EROL ARMAĞAN <sup>1</sup>

<sup>1</sup> ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI, BURSA

<sup>2</sup> ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ, ACİL SERVİS, BURSA

### Giriş:

Çalışmanın amacı acil servise intihar girişimi nedeniyle başvuran hastaların demografik özellikleri, intihar girişim yöntemleri ve nedenlerinin incelenmesidir.

### Yöntem:

Çalışma Şubat ve Kasım 2009 tarihleri arasında Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil Servisine intihar girişimi nedeniyle başvuran ve "İntihar girişimleri geri bildirim formu" kaydı olan 15 yaş üstü bireylerin retrospektif olarak değerlendirilmesi ile oluşturulmuştur.

### Bulgular:

Çalışmaya 92 si kadın (%82.2), 20 si erkek (%17.8) toplam 112 olgu dahil edildi. İntihar girişimlerinin en sık 15-24 yaş arasında olduğu saptandı (n:80, % 71.4). Her iki cinsiyette de ilaç içerek intihar girişiminde bulunmak daha yaygındı ve aile sorunları en yaygın intihar nedeniydi.

### Sonuç:

Olgularımızın çoğu 15-24 yaş arası gençlerden ve kadınlardan oluşmaktadır. İntihar girişimlerinin en önemli nedenleri ailesel sorunlar ve aile içi şiddetten oluşmaktadır. En yaygın yöntem olarak ilaçların kullanılması ülkemizde yapılan diğer çalışmaların sonuçları ile benzerdir.

### Anahtar Kelimeler:

İntihar, acil servis, psikososyal destek birimi.

## P-49 ACİL SERVİSTE ELEKTROLİT ANORMALLİĞİ SAPTANAN OLGULARIN İNCELENMESİ

ÖZLEM KÖKSAL , ARIF KADRİ BALCI , EROL ARMAĞAN , FATMA ÖZDEMİR , ATAMAN KÖSE

UÜTF ACİL TIP ANABİLİM DALI, BURSA

### Giriş:

Bu çalışma acil servis (AS)'e başvuran ve elektrolit anormalliği saptanan hastaların özelliklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

### Yöntem:

Prospektif olarak yürütülen bu çalışmaya Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi AS'ine başvuran ve elektrolit anormalliği saptanan ≥18 yaş hastalar alınmıştır.

### Bulgular:

Çalışmaya alınan 460 olgunun %46.5'i kadın ve %53.5'i erkek, ortalama yaş 58.84±0.78 idi. Başvuru semptomlarına göre; %13.3 ile dispne ilk sırada yer alırken, bunu ateş (%12.8), halsizlik (%9.3), karın ağrısı (%7.8) ve şuur bulanıklığı (%5.2) takip ediyordu. Fizik muayene bulgularına göre; %11.1'inde şuur bulanıklığı, %5.4'ünde ödem, %2.9'unda oligüri/anüri, %2.2'sinde tetani ve %1.3'ünde chvostek-trousseau belirtisi vardı. Hastaların %53.9'unda çekilen EKG normal sinüs ritmi iken, kalan olgularda patolojikti ve en sık (%23.9) saptanan patoloji supraventriküler taşikardıydı. Ek hastalıklarına bakıldığında; %22.4' ü onkoloji hastası iken, %5' inde hipertansiyon, %4.3'ünde kronik renal yetmezlik, %3.5' inde diyabet, %2.4' ünde koroner arter hastalığı vardı. Onkolojik tanılarının başında %6.4 ile akciğer malignitesi geliyordu ve tüm onkolojik hastaların %47.6' sında metastaz vardı. Kullandıkları ilaçlar açısından; ACEİ(%8.3), potasyum tutucu diüretikler (%4.1) ve lup diüretikleri (%2.4) ilk üç sırada yer alıyordu. Hastaların çoğu(%62.6) sadece serum fizyolojik ile sıvı replasman tedavisi alırken, kalanı potasyum, kalsiyum, serum sale, magnezyum vb replasmanı aldı ve 6(%1.3) hasta acil hemodiyalize alındı. Tanılarına bakıldığında; %7.4 ile pnömoni ilk sıradaydı ve onu serebrovasküler olaylar (%6.3), akut renal yetmezlik (%5.9) takip ediyordu. Hastaların %45.7'si AS' den taburcu olurken, %44.9'u yatırıldı, %6.3'ü sevk edildi, %2.2'si tedaviyi reddetti ve %0.9' u eksitus oldu.

### Sonuç:

Halen devam etmekte olan bu çalışmanın sonuçlarına göre, serum elektrolit anormallikleriyle acil servislerde sık karşılaşıldığını ve pek çok hastalık grubunda görülebileceğini söyleyebiliriz.

### Anahtar Kelimeler:

Acil Servis, Elektrolit anormalliği, Erişkin hasta.