



∞ Türk Psikiyatri Dergisi ∞

Turkish Journal of Psychiatry

CİLT | Volume 26

YAZ | Summer 2015

EK | Supplement 1: **19. YILLIK TOPLANTISI ve KLİNİK EĞİTİM SEMPOZYUMU**

BİLDİRİ ÖZETLERİ

ISSN 1300 – 2163

TÜRKİYE
SİHİN VE
RUH SAĞLIĞI
DERNEĞİ

MULTİPLE SKLEROZ TANILI BİR HASTADA İLK EPİZOD PSİKOTİK ÖZELLİKLİ MANİ

Fatih Sağlam¹, Halenur Tekke², Eda Aslan Üçkardeş¹

¹Merlin Üniversitesinde Tıp Fakültesinde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

²Merlin Üniversitesinde Tıp Fakültesinde Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Amaç: Bipolar bozukluğun multiple skleroz(MS) hastalarında genel popülasyondan iki kat daha fazla görüldüğü belirtilmektedir. MS tedavisi de manik epizodu indükleyebilmektedir. Bu sunumun amacı MS hastalarında görülen bipolar bozukluğu olgu sunumu eşliğinde tartışmaktır.

Olgu: Bayan G, 23 yaşında, bekar, ailesiyle yaşıyor, üniversite mezunu, çalışmıyor. Acil servise 10 gündür aşırı enerjik olma, uyuyamama, kendisini peygamber eşi olarak görme şikayetleriyle yakınları tarafından getirilen hasta kendisine zarar verilebileceğini düşünmekte, bunlarla ilgili işitsel halüsinasyonlar tariflemekteydi. 2 yıl önce MS tanısı aldığı ve halen interferon-B kullandığı, 20 gün önce atak tedavisi için 5 günlük parenteral steroid kullandığı öğrenildi. Hasta dağınık görünümdeydi. Bilinç açık, yönelimi tam, dikkati azalmış, kooperasyon kurulmakta zorluk çekiliyordu. Affektü çöküdü. İşitsel halüsinasyonları, grandiyoz ve perseksiyon hezeyanları mevcuttu, iç gördü yoktu. Uyku azalmış, psikomotor aktivite artmıştı. Özgeçmiş öyküsünde eşikaltı depresif belirtilerin olduğu dönemler mevcuttu, major psikopatoloji saptanmadı. Ailede ruhsal hastalık öyküsü yoktu. Laboratuvar ve EEG tetkikleri normaldi. Serebral MR'da demyelinizan hastalık ile uyumlu bulgular saptandı, nöroloji konsültasyonunda ek öneride bulunmadı. Hasta psikotik özellikli manik epizot tanısıyla kliniğe yatırıldı, olanzapin 10mg/gün, sodyum valproat 1000 mg/gün başlandı. Mevcut tedaviyle psikotik belirtiler geriledi, yatışının 15. gününde duygudurum ötimik hale geldi, 20. gününde taburculuğu yapıldı. Takiplerde olanzapin kesildi, halen sodyum valproat 1000mg/gün ile ötimidedir.

Tartışma: MS'de görülen bipolar bozukluk eş tanı olabileceği gibi MS tedavisinde kullanılan ilaçlar da psikiyatrik bozuklukları indükleyebilmektedir. Yapılan çalışmalarda serebral MR görüntülerine dayanarak bipolar bozukluk ile MS'in ortak patofizyolojik mekanizması olabileceği ileri sürülmüştür. MS'de kullanılan kortikosteroid ve interferon tedavileri de manik epizodu indükleyebilmektedir. Sonuç olarak MS ve bipolar bozukluk arasındaki ilişki henüz aydınlatılabilmemiş değildir, klinisyenlerin MS hastalarında görülen psikiyatrik belirtiler konusunda dikkatli olmaları gerekmektedir.

Kaynaklar

Chwastiak LA, Ehde DM (2007) Psychiatric issues in multiple sclerosis. *Psychiatr Clin North Am*, 30:803-17.

Idiman E, Gülşay Z, Doganer I (1994) Multiple sclerosis and affective disorder HLA class I and class II antigens and MRI. *J Neurol*, 241:140.

Anahtar Kelimeler: Bipolar bozukluk, multiple skleroz, psikotik özellikli manik epizot