



ESTETİK
PLASTİK
CERRAHI
DERNEĞİ
1991

ESTETİK PLASTİK CERRAHI DERNEĞİ & ULUSAL KONGRESİ AESTHETIC PLASTIC SURGERY SOCIETY & NATIONAL CONGRESS

ASİMETRİK MEME HİPERTROFİSİNDE İNFERİOR PİRAMİDAL TEKNİK İLE DÜZELTME

Dr. Nazım Gümüş, Dr. Kenan Çoban

Genellikle meme büyüklük, şekil ve pozisyonundaki küçük farklılıklar hastalar tarafından normal olarak kabul edilir. İki meme arasındaki belirgin farklılık, ciddi fizik, sosyal ve psikolojik şikayetlere neden olabilir. Bu çalışmada 7 olguda, asimetrik meme hipertrofisi inferior piramidal küçültme mammoplastisi yöntemi ile düzeltildi. Hastaların ortalama yaşı 27,6 (21-31) idi. Operasyon öncesinde, meme küçültme, areola-nipl repozisyonu ile meme pitozu ve asimetrinin düzeltilmesi planlandı.

Her bir hastadan 975 ile 1200 gr arasında doku eksizyonu yapılırken, iki meme arasındaki eksiz edilen doku farkı 225-600 gr olarak bulundu. Memeler arasındaki simetri ve iyi bir projeksiyon küçültme ile birlikte temin edildi.

Asimetrik meme hipertrofisi düzeltilmesinde inferior piramidal teknik uygulaması, niple hissinin korunması, iyi projeksiyon sağlanması, niple-areola beslenmesinin güvenli olması ve cerrahi sonrası süt verme ihtimalinin yüksek olması avantajları nedeniyle tercih edilebilir bir yöntemdir.