

yara?
sizin için sorun mu



04 - 07 Kasım 2009, Almira Otel - BURSA

Bilimsel Program ve Abstract Kitabı



REKTUMA DERİNLEŞEN PERİNEAL SAVAŞ YARASINDA VAKUM YARDIMLI PANSUMAN UYGULAMASI

Nazım Gümüş

Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, Adana

Giriş: Vakum yardımcı yara tedavisi değişik klinik uygulamalarda başarılı olarak kullanılmaktadır. Burada, perine bölgesinde karmaşık bir savaş yarası olan hastadaki negatif basınçlı pansuman uygulamasının etkili sonuçları sunulmuştur.

Materyal ve metod: Irak'ta yaralanma sonrasında yapılan dört günlük başlangıç tedavisinin ardından hastanemize gönderilen hastanın perine bölgesindeki yara, kontamine, kirli ve yabancı cisim içermekteydi, ayrıca ciddi miktarda nekroz ihtiva etmekteydi. Perineal yaralanma-sadece geniş bir cilt defekti değil, aynı zamanda rektal perforasyona neden olacak derin bir yaraya neden olmuştu. Bu nedenle rektal içerik yara ve çevresini kontamine ve enfekte hale getirmişti. Hastanın genel durumunun düzeltilmesinin ardından, acil operasyona alındı. İlk olarak kolostomi açıldı; ardından rektum ve perine arasındaki fistül yolu canlı kanayan doku görününceye kadar geniş olarak debride edildi. Ardından, negatif basınçlı pansuman uygulandı.

Bulgular: Pansuman uygulaması üç günlük aralıklarla 12 gün süreyle yapıldı. Fistül tamamen kapandı ve herhangi bir sızıntıya müsaade etmedi. Yara zemininde ciddi granülasyon gelişti. Lokal fleplerin mobilizasyonu ile yara kapatıldı.

Sonuç: Bu tecrübe, alışılmadık bölgelere yerleşen, savaş yaralanması gibi sıkıntılı nedenlerden kaynaklanan ve daha önemlisi ciddi enfeksiyon ve ilerleyici nekroz riski olan yaralarda vakum yardımcı pansumanın yara iyileşmesine önemli katkıları olabileceğini göstermektedir.