



# 35. Ulusal Gastroenteroloji Haftası

Regnum Carya Golf & Spa Resort, Antalya  
21 - 25 Kasım 2018

SS-032

## Anti HCV Pozitif Saptanıp Takip ve Tedavisiz Kalmış Hastalar: Farkındalıkın Arttırılması Gerekli

Mustafa Zanyar Akkuzu, Serkan Yaraş, Osman Özdoğan, Enver Üçbilek, Fehmi Ateş, Engin Altıntaş, Orhan Sezgin, İbrahim Yılmaz

Mersin Üniversitesi gastroenteroloji bilim dalı

**GİRİŞ-AMAC:** Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine 2013-2018 yılları arasında herhangi bir nedenle başvuran, Anti HCV pozitifliği saptanmış ama sonrasında takipsiz kalmış veya ileri işlem ve tedaviyi kabul etmemiş hastaların sıkılığının tespiti, bunların tedavisi tekrar planlanması, doktorlar ve sağlık çalışanları arasında Anti HCV pozitifliği saptanmış hastaların ilgili branşlara yönlendirilip yönlendirilmediği konusunu değerlendirmeyi amaçladık.

**METOD:** Hastane veri kayıt sistemi taranarak, son 5 yıllık dönemde (2013-2018 yılları arasında), herhangi bir nedenle hastaneye başvurusunda viral belirtepler istenmiş ve Anti HCV pozitif saptanmış hastalar tespit edildi. Bu hastalar ilk anti HCV saptandığı kliniğe göre gastroenteroloji, enfeksiyon hastalıkları ve diğer klinikler (acil servis, kan merkezi, ameliyat öncesi hazırlık sırasında) olarak sınıflandırıldı. Anti HCV pozitif olup ilgili branşlara (gastroenteroloji ve enfeksiyon hastalıkları) yönlendirilmemiş hastalar ve yönlendirilemelerden HCV RNA pozitif saptanmasına rağmen tedavi başlanmamış veya kontrole gelmemiş hastalar tespit edildi ve bunların kliniklere göre dağılım oranları hesaplandı.

**BULGULAR:** Bu sürede toplam 65853 kişide viral belirtepler istenmiş olup bunların 64735'i (% 98,3) Anti HCV negatif, 1118'i (% 1,7) Anti HCV pozitif saptanmıştır. Anti HCV pozitif saptanılanlardan 382 (%35,06) kişi gastroenteroloji bölümünde, 417 (%37,3) kişi enfeksiyon bölümünde ve 309 (%27,64) kişi diğer kliniklere başvurmuştur. Çalışmamızda gastroenteroloji ve diğer kliniklere başvuranlar alındı. Diğer kliniklerde tespit edilmiş 309 hastadan 241/309 (%78) hasta ilgili branşlara yönlendirilmiş ve bunlardan 44/241 (%18,25) hasta çeşitli nedenlerle ölmüş, 30/241 (%12,45) hastada HCV RNA pozitif olup tedavi başlanmıştır, 20/241 (%8,3) hasta da ilgili branşlara yönlendirilmiş ve HCV RNA pozitif saptanmış ama sonrasında herhangi bir takibi olmaya rağmen tedavi başlanmamıştır ve 147/241 (%60) hastada HCV RNA negatif saptanmıştır. Diğer kliniklerde tespit edilen hastalardan 68/309'u (%22) Anti HCV pozitif saptandıktan sonra ilgili bir bölümde yönlendirilmemiş ve tekrar hastanede hepatit C ile ilgili hiçbir değerlendirme yapılmamış. Gastroenteroloji kliniğinde anti HCV pozitif saptanmış hastalardan 380/392 (% 96,93) hasta takibe gelmiş olup gerekli planlamaları yapılmıştır. Bunlardan 357/380 (%94) hastanın tedavi planı yapılmış ama 23/380 (%6,9) hastanın HCV RNA'sı pozitif olmasına rağmen biyopsi ve/veya tedaviyi kabul etmemiş olup takibe gelmemiştir. 7/392 (% 1,8) hasta Anti HCV pozitifliğinden sonra çağrılmasına rağmen takiplerine gelmemiştir.

**SONUÇ:** Gastroenteroloji kliniğinde 30 (%7,66) hasta gereklî işlemleri yapılması veya önerilmesine rağmen takip ve tedaviyi kabul etmemiştir. Ama diğer kliniklerde 68 (%22) hasta ilgili branşlara yönlendirilmemiş, toplamda 88 (%28,5) hasta gereklî takip ve tedaviye katılmıştır. Çalışmamız geriye dönük olduğu için bunların hasta veya hekim kaynaklı sebebin bilmiyoruz.

**Anahtar Kelimeler:** Hepatit C, Anti Hcv pozitif hastalar, Tedavi almamış hepatit c hastalannın tespiti, Hepatit C eradikasyonu

Toplam hasta dağılım tablosu

	Anti HCV pozitif	Anti HCV negatif	Toplam
Gastroenteroloji kliniği	382 (%35,06)	8248 (%12,75)	8640 (%13,12)
Diğer klinikler	309 (%27,64)	50418 (%77,88)	50727 (%77,03)
Enfeksiyon kliniği	417 (%37,3)	6069 (%9,37)	6486 (%9,85)
<b>TOPLAM</b>	<b>1118 (%1,7)</b>	<b>64735 (% 98,3)</b>	<b>65853</b>